

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイルホワイティE
Smile Whiteye

目薬

第2類医薬品

充血とって澄んだ白目に

疲れ目にも効果。*代謝力促進。

健康的な瞳のために。

充血・疲れ目にアプローチ

即効 白目クリア処方 + *代謝力促進

充血除去成分とその働きをサポートする成分を配合。
素早く充血を除去し、白く澄んだ瞳に導きます。

- 塩酸テトラヒドロゾリン
- グリチルリチン酸二カリウム
- クロルフェニラミンマレイン酸塩

栄養と酸素を補給し、新陳代謝を促進。
疲れた瞳を癒します。

- L-アスパラギン酸カリウム
- パンテノール

*成分としての作用

全ての有効成分 最大量*1配合

*1 一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大量配合

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみ改善されない場合。
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

必ず裏面もお読みください

● 効能


結膜充血、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
塩酸テトラヒドロゾリン	0.05g	目の充血を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25g	目の炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03g	目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。
パンテノール	0.1g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。
L-アスパラギン酸カリウム	1g	目に酸素を取り込むアミノ酸類です。

添加物として、アミノカプロン酸、エデト酸Na、プロピレングリコール、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、L-メントール、ゲラニオール、pH調整剤を含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

この目薬は、携帯袋を入れておりません。

— お問合せ先 —

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7